

Чи є якісь побічні ефекти?

У місці ін'єкції часто з'являється набряк, почервоніння або чутливість. Іноді утворюється невелика безболісна шишка, яка зазвичай зникає через декілька тижнів. Більш серйозні наслідки виникають рідко, але включають підвищення температури, головний біль, запаморочення або слабкість, нудоту та набрякання залоз.

Якщо після щеплення Ви почуваетесь погано, прийміть парацетамол. Уважно прочитайте інструкції на флаконі або коробці та прийміть правильну дозу для свого віку. Якщо необхідно, прийміть другу дозу через 4-6 годин.

Якщо Ваша температура все ще висока після другої дози, зверніться до свого лікаря загальної практики або зателефонуйте на безкоштовну лінію Національної служби охорони здоров'я (NHS) 111.

Якщо у Вас виникли будь-які підозрювані побічні ефекти після вакцини, Ви можете повідомити про це на вебсайті Жовтої картки (Yellow Card), зателефонувавши за номером 0800 731 6789 (з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 17:00), або завантаживши додаток Yellow Card.
www.mhra.gov.uk/yellowcard

Зараз саме час перевірити, чи пройшли Ви всі свої щеплення


Щеплення для
молоді



Щеплення
Національної
служби охорони
здоров'я (NHS)



Щоб дізнатися більше про підліткові вакцинації, відвідайте www.nhs.uk/vaccinations або читайте <https://qrco.de/YoungPeopleImms>



**Ще не пізно отримати дози,
які Ви могли пропустити.**

Цю листівку підготувало Агентство з охорони здоров'я Великої Британії.

© Crown copyright 2023. 1P 100K JULY 2023 (APS). Product code: YP3B8G1UK
Ukrainian. UK Health Security Agency gateway number: 2023190.

Цю листівку можна замовити або завантажити за посиланням:
www.healthpublications.gov.uk, або зателефонувавши: 0300 123 1002
(лінії працюють з понеділка по п'ятницю, з 8:00 до 18:00).

Можна замовити паперові копії цієї листівки англійською мовою.

Можна також замовити цю листівку у перекладі.



UK Health
Security
Agency

Бустерна доза **Td/IPV**

3 в 1 для підлітків



У 14 років або в 9 класі школи Ви маєте право на підліткову бустерну дозу вакцини 3 в 1, яка захищає від правця, дифтерії та поліомієліту. **Вакцина Td/IPV підвищить імунітет Вашого організму до цих інфекційних захворювань, який, можливо, знизився під час дорослішання.**

Від чого мене захищає ця вакцина?

П

Правець

Правець – це болісне захворювання, яке вражає нервову систему та може призвести до м'язових спазмів, спричинити проблеми з диханням і смерть. Він виникає, коли мікроби, що знаходяться в ґрунті та гної, потрапляють в організм через відкриті порізи або опіки. Правець не може передаватися від людини до людини.

Д

Дифтерія

Дифтерія – це серйозне захворювання, яке зазвичай починається з болю в горлі та може швидко викликати проблеми з диханням. Вона може пошкодити серце та нервову систему, а у важких випадках - призвести до смерті.

IPV

Поліомієліт

Поліомієліт - це вірус, який вражає нервову систему, що може викликати незворотній параліч м'язів. Якщо поліомієліт вражає м'язи грудей або мозок, він може привести до смерті.

Підліткова бустерна вакцина називається «Реваксіс» (Revaxis), Ви можете прочитати Інформаційну листівку пацієнта на сторінці www.medicines.org.uk/emc/product/5581/pil

Якщо я був щеплений проти правця, дифтерії та поліомієліту в дитинстві, чи я все ще повністю захищений?

Ні, Вам все одно знадобиться бустерна доза вакцини для підтримки попереднього захисту.

Скільки бустерних доз мені потрібно отримати?

Для формування та підтримки імунітету Вам необхідно ввести 5 доз вакцин проти правця, дифтерії та поліомієліту.

Ви повинні були отримати:



перші 3 дози

у ранньому дитинстві



доза 4

коли ви були у віці 3 - 5 років, це дошкільна бустерна доза



доза 5

отримується в 9 класі (від 13 до 14 років)

Чи знадобляться мені додаткові бустерні дози в майбутньому?

Ймовірно, вам не знадобляться подальші бустерні дози цих вакцин. Однак Вам можуть знадобитися додаткові дози деяких інших вакцин, якщо Ви відвідуєте певні країни, або якщо у Вас є травма, Вам може бути потрібна ще одна ін'єкція проти правця. Зверніться до медсестри у Вашій амбулаторії загальної практики.

Як я отримаю бустерну дозу Td/IPV?

Ви отримаєте 1 (одну) ін'єкцію у плече. Ніхто не любить уколи, але це відбувається дуже швидко. Використовувані голки маленькі, і Ви повинні відчути лише крихітний укол. Якщо Ви трохи нервуете перед ін'єкцією, повідомте про це медсестру або лікаря перед тим, як її пройти.

Чи є якісь інші щеплення, які мені потрібно пройти зараз?

Коли Ви проходите бустерну вакцинацію Td/IPV, Ви також можете отримати менінгококову вакцину (MenACWY). Ви повинні отримати її до закінчення школи. Зверніться до своєї шкільної медсестри, якщо Ви пропустили вакцинацію і все ще ходите до школи. Якщо Ви вже залишили школу, Вам слід звернутися до свого лікаря загальної практики, щоб надолужити пропущені щеплення. Бажано перевірити у свого лікаря загальної практики, чи всі інші Ваші щеплення зроблені вчасно, включаючи щеплення проти вірусу папіломи людини (HPV) та щеплення проти кору, паротиту та краснухи (MMR).

Якщо Ви ще не отримували вакцину MMR, Вам слід отримати одну дозу зараз й іншу через 1 місяць, щоб захистити себе від кору, паротиту та краснухи.

