NHS | UK Health Security Agency

آپ کے بچے کے ٹیکے کا شیڈول

8 ہفتے

- 1 میں 6 ٹیکہ*
- روٹا وائرس کا ٹیکہ*
- مینن‌جائٹس بی کا ٹیکہ*

12 ہفتے

- 1 میں 6 ٹیکہ**
- نیوموکوکل کا ٹیکہ*
- روٹا وائرس کا ٹیکہ**

16 ہفتے

- 1 میں 6 ٹیکہ***
- مینن‌جائٹس بی کا ٹیکہ**

1 سال

- ہیموفیلس انفلوئنزا ٹائپ بی/ مینن‌جائٹس سی کا ٹیکہ*
- میزلز، ممپس اور روبیلا کا ٹیکہ*
- نیوموکوکل کا ٹیکہ**
- مینن‌جائٹس بی کا ٹیکہ***



2+ سال

- بچوں کا فلو کا ٹیکہ (سالانہ)



3 سال اور 4 ماہ

- میزلز، ممپس اور روبیلا کا ٹیکہ**
- 1 میں 4 پری اسکول بوسٹر ٹیکہ

* پہلی خوراک، **دوسری خوراک، *** تیسری خوراک

1 میں 6 ڈفتھیریا، ٹیٹنس، کالی کھانسی، پولیو، ہیموفیلس انفلوئنزا ٹائپ بی اور ہیپاٹائٹس بی سے بچاتا ہے

1 میں 4 ڈفتھیریا، ٹیٹنس، کالی کھانسی اور پولیو سے بچاتا ہے

یہ ٹائم لائن ایک مفید یاد دہانی کے بطور اوپر چپکائیں

بیماریوں کے خلاف اپنے بچوں کا تحفظ کرنے کے لیے ان کے ٹیکہ کے شیڈول پر عمل کریں

- خسرے اور کالی کھانسی جیسی بچپن کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں
- یہ بیماریاں بچوں کو کافی بیمار بنا سکتی ہیں، جو ہسپتال میں بھرتی ہونے کا یا تاحیات مسائل کا باعث بنتی ہیں
- اگر آپ کے بچے کو ٹیکہ نہیں لگا ہے تو، وہ تحفظ یافتہ نہیں ہیں
- بہترین تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ٹیکے وقت پر لگائے جائیں۔ کچھ کو بعد میں بھی بوسٹر خوراکوں کی ضرورت پڑتی ہے
- اپنے بچے کا ذاتی بچے کی صحت کا ریکارڈ (لال کتاب) چیک کریں یا اپنے جنرل پریکٹشنر (GP) کی پریکٹس سے بات کر کے پتہ کریں کہ آیا ان کا کوئی ٹیکہ چھوٹ گیا ہے
- آپ اب بھی بیشتر چھوٹے ہوئے ٹیکوں کو لگوا سکتے ہیں
- بچپن کی سبھی ٹیکہ کاریاں مفت ہیں۔ بچوں کی عمر بڑھنے پر، انہیں ٹیکہ کی مزید اپائنٹمنٹس، براہ راست تب تک پیش کی جائیں گی جب تک وہ ٹین ایجر نہ ہو جائیں۔ کچھ ٹیکے اسکول میں پیش کیے جاتے ہیں
- NHS کی طرف سے پیش کردہ ٹیکہ کاریوں کی پوری طرح سے جانچ کر کے یہ تشخیص کی جاتی ہے کہ وہ کس قدر محفوظ اور مؤثر ہیں۔ ساری دوائیں ضمنی اثرات کا سبب بن سکتی ہیں، لیکن ٹیکے بہت ہی محفوظ ترین میں سے ہیں۔
- دنیا بھر میں ہونے والی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مامونیت ہمارے بچوں کی صحت کا تحفظ کرنے کا سب سے محفوظ طریقہ ہے

کیا آپ کے بچے کے ٹیکے اپ ٹو ڈیٹ ہیں؟

ان کے جنرل پریکٹشنر کی پریکٹس میں ابھی بُک کریں

CHIMMS24PC

© Crown copyright