

د واکسیناسیون په هکله یو لارښوونه  
د یوه کال په عمر  
کښې



له فبروري 2022 کال راهیسته د واکسیناسیون ځانگړنې

# د ماشوم د واکسیناسون برنامه

په یاد ولرئ چي باید هر اپوائنټمنټ ته د واکسیناسیون خپل سور کتاب له ځانه سره راوړئ.



د دغو کتابگوټو کابیانې تاسي له خپل کلینک یا ډاکټر سر جري څخه ترلاسه کولای سئ دلته یې هم وگورئ [www.nhs.uk/vaccinations](http://www.nhs.uk/vaccinations) په لیفلېټ کېښې د 2022 فبروري څخه د واکسیناسیون ځانگړنې شته

## لنډيز

### زما ماشوم به پوکلنئ کښې کوم واکسيناسيون اخلي؟

ستا ماشوم ته به 4 پيچکاري ورلگول کېږي د يوکلنئ د واکسيناسيون د ورتگ پر مهال په گډون د:

■ د هغوی د **MenB** بوستر واکسيناسيون

■ يو **Hib/MenC** واکسيناسيون پرضد د:

■ Hib (هايموفيلوس انفلوینزا ټايپ ب)، او

■ مېنينگوکوکال گروپ سي ناروغي (MenC)

■ يو **PCV13** بوستر واکسيناسيون پرضد د:

■ نيومکوکال ناروغي چي د نيومکوکال باکټريا له لاسه پېښېږي

■ د هغوی رومبني **MMR** واکسيناسيون پرضد د:

■ شری

■ ممپس يعني ټنډر بوزی

■ روبیلا يعني سرې دانې



## په یو کلنئ کبني واکسیناسیون

د Hib ، میننگوکوکل گروپونو B او C ناروغی، د نیوموکوکل ناروغی، شری، ممپس او روبیلا په وړاندې ساتنه

### Hib څه شی دی؟

Hib یو انتان دی چې کولای شي د یو شمیر لویو ناروغیو لامل شي لکه مننژیتس (د دماغ د استر التهاب)، سپتیسیمیا (د وینې مسمومیت) او سینه بغل، په ځانگړې توگه په کوچني ماشومانو کې.

د Hib/MenC واکسین د Menitorix په نوم یادېږي، تاسو کولای شئ د ناروغ معلوماتو پانې وگورئ دلته

[www.medicines.org.uk/emc/product/167/pil](http://www.medicines.org.uk/emc/product/167/pil)

### مننگوکوکال څرنګه ناروغي وي؟

مننگوکوکل ناروغي یو جدي انتان دی چې کولای شي په ماشومانو او ځوانانو کې د مننژیتس او سپتیسیمیا لامل شي.

د B گروپ میننگوکوکل باکتریا (MenB) اوس مهال په انگلستان کې د میننگوکوکال ناروغی د ډېرو پېښو لامل دي، پداسې حال کې چې د میننگوکوکال گروپ C (MenC) ناروغي اوس غیر معمولي ده ځکه چې ډیری کوچني ماشومان او تنکي ځوانان په منظم ډول د MenC پروړاندې واکسین کېږي.

د MenB واکسین د Bexsero په نوم یادېږي، تاسو کولای شئ د ناروغ معلوماتو پانې وگورئ دلته

[www.medicines.org.uk/emc/product/5168/pil](http://www.medicines.org.uk/emc/product/5168/pil)

## کوم واکسینونه به وکارول شي؟

ستاسو ماشوم به د Hib/MenC واکسین او همدارنگه د MenB واکسین یو مشترک بوستر دوز ولري. دا واکسین به د وړانډه یا مټ په پورتنیو پلو یعنی عضلاتو کې ورولگول شي.

## زما ماشوم بوستر واکسین ته ولې اړتیا لري؟

بوستر واکسیناسیون د هغه خوندیتوب د زیاتولو لپاره ورکول کېږي چې مخکې له مخکې د هغه واکسینونو په واسطه ورکړل شوي دي چې ستاسو ماشوم ته پخوا ورلگول شوي ول. د ماشومانو د واکسینونو لخوا ترلاسه شوی خوندیتوب له یو څه وخت وروسته له مینځه تللی شي. بوستر دوز د خوندیتوب د پاته کېدلو موده نوره غځوي.

## ایا د Hib/MenC او MenB واکسینونه کومې اړخیزې اغیزې لري؟

ستاسو ماشوم ممکن د پیچکاری پر ځای باندي سوروالی، پرسوب یا نرموالی ولري. نږدې نیمايي ماشومان چې واکسین لگوي ممکن خارش ورباندي ولگېږي، او ځینې یې معتدله تبه هم لري. تاسو کولای شئ پدې اړه نور معلومات له خپل جی پی، پریکتس نرس یا هیلت ویزیټور څخه ترلاسه کړئ.



## د نیوموکوکال ناروغي څه شی وي؟

د نیوموکوکال یا سینه بغل ناروغي په ماشومانو کې د باکتریايي مننژیتس یو له عامو لاملونو څخه دی مگر دا د سپټیکیمیا، سینه بغل، د غوږ انتان (اوتایټس میډیا) او نورو سختو ناروغيو لامل هم کېږي. د نیوموکوکال باکتریا تر 90 زیات مختلف ډولونه لري.

## کوم واکسین به وکارول شي؟

کارول کېدونکي واکسین د PCV13 یو بوستر خوراک دی (د نیوموکوکال کنجوگېټ واکسین) کوم چې د هغو 13 مختلفو نیوموکوکال ډولونو پروړاندې خونديتوب ورکوي چې ډیری وختونه په ماشومانو کې د نیوموکوکال ناروغۍ لامل کېږي. دا واکسین به د Hib/MenC واکسینونو په څیر پر وړاندۀ یا د مټ پورتنیو عضلاتو کې ورلگول کېږي.

## ایا د PCV واکسین کومې اړخیزې اغیزې لري؟

له هغو 10 ماشومانو څخه چې واکسین شوي دي، 1 یا 2 ممکن د پیچکاري پر ځای باندې پړسوب، سوروالی یا نرموالی یا نرئ تبه ولري. د PCV واکسین د Prevenar 13 په نوم یادېږي، تاسو کولای شئ د ناروغ معلوماتو پانې وگورئ دلته [www.medicines.org.uk/emc/product/453/pil](http://www.medicines.org.uk/emc/product/453/pil).

## شری څه شی دی؟

شری د یو ډیر ساري ویروس له لاسه پیدا کېږي. نږدې هرڅوک چې په دې اخته کېږي هغوی به لوړه تبه، خارش لري او معمولاً به ناروغ وي. د شري په مشکلاتو کې د سینې انتانات، دورې، انسيفلايټس (د دماغ انفیکشن)، او د دماغ زیان شامل دي. په ډیرو جدي حالتونو کې، شری یوڅوک وژلای شي.

## ممپس یعنی ټنډربوزی څه شی دی؟

ممپس یعنی ټنډربوزی د ویروس له لاسه رامینځته کيږي او د تې، سر درد، او په مخ، غاړې او ژامې کې د دردناک، پرسوب غدود لامل کېدلای شي. دا ممکن د دايمي کنېدلو، ویروسي مننژیتس او انسفالیتس (د دماغ التهاب او پرسوب) پایله ولري.

## روبیلا یعنی سرې دانې څه شی وي؟

روبیلا (جرمنی شری) یوه ناروغي ده چې د ویروس له امله رامینځته کيږي. په ماشومانو کې دا معمولاً معتدل وي او د پام وړ نه ګرځي. خو په امیندواری کې روبیلا د نازېرېدلو ماشومانو ته خورا جدي وي. دا کېدلای شي د دوی لید، اوریدلو، زړه او دماغ ته جدي زیان ورسوي. دا حالت د کونجینټل روبیلا سندروم (CRS) په نوم یادېږي.

## MMR واکسین څرنگه وي؟

دا د ژونديو شری، ټنډربوزی او روبیلا ویروسونو کمزوري بڼې لري. ځکه چې ویروسونه کمزوري کړل شوي وي، نو هغه خلک چې واکسین لګوي نور خلک نشي پرې اخته کولای. په انګلستان کې مور د MMR دوه ډوله واکسینونه لرو. دواړه ډیر ښه کار کوي، یو یې پورسین یعنی له سوور څخه ترلاسه شوي جیلاتین لري او بل یې نه لري. که تاسو غواړئ چې ستاسو ماشوم د پورسین جیلاتین څخه پاک واکسین ولري، نو له خپل پریکتس نرس یا جی پی سره خبرې وکړئ.

## دغه واکسین څرنگه او کله ورکول کيږي؟

دغه واکسین د وړانډه یا مټ په پورتنیو عضلاتو کې پیچکاري کېږي. دا د یو کال په عمر کې ورلګول کيږي وروسته له دې چې د ماشوم د مور څخه ترلاسه شوی خونديتوب کمزوری کېږي. مخکې له دې چې ستاسو ماشوم په شاوخوا 3 کلونو او 4 میاشتو کې ښوونځي پیل کړي د واکسین دوهم ډوز باید یو ځل بیا ورکړل شي.

## د MMR واکسین څومره اغیزمن دی؟

د MMR واکسین په 1988 کې په انګلستان کې له معرفي کیدلو راهیسته په کمکیو ماشومانو کې د دې 3 ناروغيو له مینځه وړو لپاره مسؤل دی.

## ایا د MMR واکسین کومې اړخیزې اغیزې لري؟

په واکسینو کې 3 مختلف ویروسونه په مختلف وختونو کې عمل کوي او ممکن له لومړي ډوز وروسته لاندینې اړخیزې اغیزې ولري:

■ له واکسین کولو څخه 6 څخه تر 10 ورځو وروسته، لکه څنګه چې د واکسین برخه په کار پیل کوي، په هرو 10 ماشومانو کې یو یې ممکن تبه ولري او ځینې یې ممکن د شري په څیر نرم خارش ولري او خپل خوراک پرېږدي.

■ په هرو 1,000 واکسین شوي ماشومانو کې یو یې ممکن د تبې له امله دوره ولري. دې ته فېبرایل کنولژن یعنی 'تبجن درد' ویل کیږي. په هرصورت، هغه ماشومان چې واکسین شوي نه وي، او په شري اخته کیږي، د دورې 3 چنده زیات احتمال لري.

■ د MMR واکسین لګولو نیژدې 3 اونۍ وروسته، لکه څنګه چې د واکسینو د ممپس برخه په کار پیل کوي، ځینې ماشومان ممکن په ندرت سره د ممپس یعنی ټنډربوزي (تبه او پرسېدلې غدې) په څیر علامې ولري

---

## MMR ترټولو خوندي لاره ده

---

## د خپل ماشوم د ساتنې لپاره پر

---

## وړاندي د شري، ټنډربوزي او روبیلا

---

■ په بېخي ندرت سره، ماشومان ممکن له واکسينو وروسته په 6 اونيو کې د کوچنيو زخمونو په څير دغمې ولري. دا معمولاً د واکسينو د شري يا روبيلا برخو له امله رامینځته کېږي. که تاسو دا ډول داغونه ووينئ، خپل ماشوم ډاکټر ته وروړئ چې معاينه يې کړي. ستاسو ډاکټر به تاسو ته ووايي چې څنگه د خارش چاره وکړئ او په راتلونکي کې خپل ماشوم څنگه خوندي وساتئ

■ د MMR واکسينو وروسته په يو مليون ماشومانو کې تر يوه هم کم ماشومان ممکن انسفالایټس (د مغزو خوږ او پرسوب) ولري. خو بياهم که يو ماشوم په شري اخته شي، د انسفالایټس د کېدلو چانس په 200 کې يو او په 5000 کې يو ترمنځ دی.

### که زما ماشوم د هگيو سره حساسيت ولري نو بيا؟

د MMR واکسين په خوندي ډول هغو ماشومانو ته ورلگول کېدلای شي چې د هگيو په وړاندې شديد الرجی (انافيلیکټیک عکس العمل) لري. که تاسو کومه انديښنه لرئ، د خپل هيلت ويزيتور، پريکټس نرس يا ډاکټر سره خبرې وکړئ.

### ايا د MMR واکسين جيلټين لري؟

په برتانيا کې، مور د MMR دوه واکسينونه لرو چې ډير ښه کار کوي. يو يې جيلټين لري او بل يې نه لري. که تاسو غواړئ داسي واکسين ولگوئ چې پورسين (د خوگ) جيلټين نه لري، نو له خپل پريکټس نرس يا جي پي سره خبرې وکړئ. تاسو کولای شئ د MMR واکسين د ناروغ معلوماتو پاڼي په دې ځای کې وگورئ:

پريوريکس:

[www.medicines.org.uk/emc/product/1159/pil](http://www.medicines.org.uk/emc/product/1159/pil)

:MMRVAXPRO

[www.medicines.org.uk/emc/product/6307/pil](http://www.medicines.org.uk/emc/product/6307/pil)

## د مننژیتس او سیپتیسیمیا لپاره لټون وکړئ

مننژیتس او سیپتیسیمیا دواړه خورا جدي دي. که تاسو یې وگورئ نو دا مهمه ده چې تاسو یې نخښې او نښانې وپیژنئ او پوه شئ چې څه وکړئ.

د مننژیتس او سیپتیسیمیا لومړنۍ علامې ممکن د زکام یا زکام ته ورته وي (تبه، کانگې، خاربست او بې ارامی).

خو بیا هم، هغه کسان چې مننژیتس یا سیپتیسیمیا لري هغوی کېدلای شي په څو ساعتونو کې سخت ناروغان شي، نو دا مهمه ده چې د داسې حالتونو نخښې او نښانې وپیژني.



## مننژیتس څه شی دی؟

مننژیتس د مغزو د استر یو انتان دی. مننژیتس د څو ډوله باکتريا او ویروسونو له لاسه پیدا کېدلای شي.

د مننجوکل باکتريا سره انفیکشن کولای شي د میننژیتس، سپتیسمیا (د وینې مسمومیت)، پیریکارډیتس (د کڅوړې چې زړه پکې وي د استر التهاب) او د ارترایتس (د مفصلونو د پرسوب) لامل کېږي.

په ماشومانو کې، د مننژیتس له اصلي نخښو نښانو کېنې کېدلای شي دا شامل وي:

- په لوړ غږ، فریادي ژړا
- کله چې یې راپورته کړي نو خواشینی کېږي
- راپورته شوې درازنده
- خوبولی او لږ غبرگون ښودونکی - په گرانه وېښېدل
- الوېزان او بې سېکه
- د ټکان ورکوونکو حرکتونو سره کلکوالی (خوږ/دورې)
- له خوراکه انکار، کانګې
- پوستکی یې ژیر، داغدار یا نیل رنگ لري
- تبه

## سيپتيکيميا څه شی دی؟

سيپتيکيميا يو ډير جدي حالت دی کله چې د وينې جريان کښې گزک پيدا کېږي. د سرو لاسونو او پښو نخښې، د پوستکي زېر رنگ، کانگې او ډير خوب يا ستونزمن راوېښدل، کيدای شي په چټکۍ سره راشي. که تاسو د سيپتيکيميا شک لرئ، نو په عاجله توگه مرسته ترلاسه کړئ. په ماشومانو کې، د سيپتيکيميا په اصلي نخښو نښانو کښې کېدلای شي دا شامل وي:

■ د ساه اخيستني چټکې يا غير معمولي نمونې

■ ژير، داغدار يا نيل رنگه پوستکي

■ تبه له سرو لاسونو او پښو سره

■ لړزېدل

■ کانگې او له خوږو بېزاري

■ سره يا ارغواني داغونه چې د فشار لاندې نه ورکېږي

(په راتلونکې پاڼې کې تشریح کړې د گلاس ټيسټ وکړئ)\*

■ د عضلاتو يا غړو شديدو خوږو يا گډ درد څخه درد يا

ناآرامي

■ بې ټولې توب

■ سخت خوبولي

دا مهمه ده چې په ياد ولرئ چې په هرچا کښې به فهرست کښې راغلې ټولې نخښې نښانې نه راپيدا کېږي. که چيرې په چا کښې ځينې علامې راپيدا شي، په ځانگړي توگه سره يا ارغواني داغونه، نو په عاجل ډول دې طبي مرسته ترلاسه کړي. که تاسو له خپل ډاکټر سره اړيکه نه شئ نيولای، يا د مشورې ترلاسه کولو وروسته بيا هم انديښمن ياست، نو په خپلې طبي طبعې باور وکړئ او خپل ماشوم د خپل نږدې روغتون بېړنۍ څانگې ته بوځئ.

\* په تور پوستکي، د سترگو په جېرمو کښې دننه يا د خولې په تالو کښې بې وگورئ چيرې چې داغونه ډير څرگند وي

## د 'بښښې ازموینه'

د اوبو خښلو د شفافې شیشې اړخ پر داغونو باندي ښه ټینګ ونیسئ ترڅو تاسو وګورئ چې دا د فشار لاندې کمېږي او رنگ یې ورکېږي که نه. که دا رنگ بدل نه کړي، ژر تر ژره خپل ډاکټر سره اړیکه ونیسئ.



## زه نور معلومات چیرته ترلاسه کولای شم؟

دا خیریه موسسې معلومات، مشورې او ملاتړ برابروي:

د مننژیتس ریسرچ فاونډیشن

د وړیا مرستې لاین 080 8800 3344

(د سهار له 9 بجو څخه د ماښام تر 10 بجو د اونۍ په ورځو کې، 2د)

سهار له 10 بجو څخه د ماښام تر 8 بجو پورې د اونۍ پای او رخصتۍ

کښې) [www.meningitis.org](http://www.meningitis.org)

### Meningitis Now

24 ساعته د مرستې لاین 0808 80 10 388

[www.meningitisnow.org](http://www.meningitisnow.org)

تاسو کولای شئ له خپل ډاکټر، پریکتس نرس یا هیلت ویزیتو څخه هم مشوره وغواړئ، یا NHS ته په 111 زنگ ووهئ.



مورپلار او کپرزز یعنی پالونکي کولای شي د یلو کارت سکیم له لارې د واکسینونو او درملو شکمنو اړخیزو اغیزو راپور ورکړي.

دا په انلاین توګه ترسره کېدلای شي

[yellowcard.mhra.gov.uk](http://yellowcard.mhra.gov.uk) یا د یلو

کارت په هات لاین باندي

0800 731 6789. تاسو د QR کوډ

هم کارولای شئ یا د یلو کارت ایپ په

ډاونلوډ کولو سره.

## له فبروري 2022 څخه د ماشومتوب د واکسين کولو عادي پروگرام

کله	د کومې ناروغۍ پرضد خوندیتوب	ورکول کېدونکی واکسين
د اتو اونيو په عمر	ډيپټیریا، تیتانوس، پرتوسس (شنه ټوڅ)، گوزن، د هيموفيلس انفلونزا ډول بی (Hib) او هيباتیت بی	DTaP/IPV/Hib/HepB یا 6-in-1 واکسين
	د منينکوکوکل گروپ (B MenB)	MenB
	روتاويروس گاسټروپټیریتس <sup>4</sup>	روتاويروس
د دوولسو اونيو عمر	ډيپټیریا، تیتانوس، پرتوسس، گوزن، Hib او هيباتیتس بی	DTaP/IPV/Hib/HepB
	نيوموکوکل (13 سيروتايبس)	د نيوموکوکل کنجوگيټ واکسين (PCV)
د شپاړسو اونيو عمر	ډيپټیریا، تیتانوس، پرتوسس، گوزن، Hib او هيباتیتس بی	DTaP/IPV/Hib/HepB
	MenB	MenB
	Hib او MenC	Hib/MenC
يو کلن د ماشوم په لومړۍ کليزه يا له هغه وروسته	د نيوموکوکل بوستر	PCV
	شری، ممپس یعنی ټنډریوزی او روبیلا (جرمنی شری)	MMR <sup>2</sup>
	MenB	MenB بوستر
	انفلونزا (هر کال له سپتمبر څخه)	LAIV <sup>2,3</sup>
د مستحقو ماشومانو عمر گروپ <sup>1</sup>	ډيپټیریا، تیتانوس، پرتوسس او گوزن	dTaP/IPV
	شری، ممپس یعنی ټنډریوزی او روبیلا	MMR (لومړی ورکول شوی دوز چیک کړئ) 2
هغه هلکان او نجونې چې عمر ونه پیل له دولسو څخه تر ديارلس کلونو پورې وي	هغه سرطانونه او تناسلي مرخیري چې د ځانگړي انساني پاپیلوما وروس (HPV) ډولونو له امله رامینځته کېږي	HPV (دوه ډوزونه د 6-24 میاشتو په واټن)
څوارلس کلن (د نبونڅي 9 کال)	تیتانوس، ډيپټیریا او پولیو یعنی گوزن	Td/IPV (د MMR حالت وگورئ)
	د منينکوکوکل گروپونه A، C، W او Y	MenACWY

[1] په [www.nhs.uk/conditions/](http://www.nhs.uk/conditions/) يا [www.gov.uk/government/publications/influenza-the-green-book-chapter-19](http://www.gov.uk/government/publications/influenza-the-green-book-chapter-19)

[2] [vaccinations/child-flu-vaccine](http://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/child-flu-vaccine) کې گرین بوک څپرکی 19 وگورئ. کمزوری کړل شوې ژوندی انفلونزا واکسين (LAIV)

او د MMR واکسين له دوه براندونو څخه یو د پورسین جیلاتین لري. [3] که چېرې LAIV (د انفلونزا کمزوری کړل ژوندی

واکسين) له خنډ سره مخامخ شي او ماشوم د کلینیکي خطر گروپ کې وي، نو د غیر فعال فلو واکسين وکاروئ. [4] د روتا ویروس

له ورکولو مخکې د SCID سکرینینگ پایله وگورئ

## د هغو کسانو لپاره اضافي واکسينونه چي د اساسي طبي حالات لري

واکسين چې پکار دي	د ناروغيو په وړاندې خونديتوب	طبي حالت يعني ناروغي
MenACWY MenB PCV13 (تر لسو کلونو پورې) 3 PPV (له دوه کلنۍ څخه) د انفلوینزا يعني زکام کلني واکسين	د مینګوکوکل ګروپونه A، B، C، W او Y نیوموکوکل انفلوینزا	اسپلینیا یا د توري خرابی (د سیکل سیل او سیلیک ناروغۍ په شمول)
PCV13 (تر لسو کلونو پورې) 3 PPV (له دوه کلنۍ څخه)	نیوموکوکل	د کولیر امپلانتونه يعني پيوندکاري
PCV13 (تر لسو کلونو پورې) 3 PPV (له دوه کلنۍ څخه) د انفلوینزا يعني زکام کلني واکسين	نیوموکوکل انفلوینزا	اوپډمهاله ساه اخيستني او د زړه ناروغي (لکه شدید ساه لنډي، د سپرو اوپډمهاله ناروغي، او د زړه بندیدل)
PCV13 (تر لسو کلونو پورې) 3 PPV (له دوه کلنۍ څخه) د انفلوینزا يعني زکام کلني واکسين	نیوموکوکل انفلوینزا	اوپډمهاله عصبي ناروغيانې (لکه د پارکینسن یا د موټرو نیورون ناروغي، یا د زده کړې معلولیت)
PCV13 (تر لسو کلونو پورې) 3 PPV (له دوه کلنۍ څخه) د انفلوینزا يعني زکام کلني واکسين	نیوموکوکل انفلوینزا	شکره
PCV13 (تر لس کلنې پورې) 3 PPV (له دوه کلنۍ څخه) د انفلوینزا يعني زکام کلني واکسين هپتایټس بی	نیوموکوکل(څلورمه او پنځمه مرحله CKD) انفلوینزا(مرحله 3، 4 او 5 CKD) هپتایټس بی (په څلورمه او پنځمه مرحله CKD)	د پښتورگو اوپډمهاله ناروغي (CKD) د هیموډالیسیس په شمول)
PCV13 (تر لس کلنې پورې) 3 PPV (له دوه کلنۍ څخه) د انفلوینزا يعني زکام کلني واکسين هپتایټس ای هپتایټس بی	نیوموکوکل انفلوینزا هپتایټس ای هپتایټس بی	د ینې اوپډمهاله ناروغيانې
هپتایټس ای هپتایټس بی	هپتایټس ای هپتایټس بی	هیموفیلیا
PCV13 (تر لس کلنې پورې) 3 PPV (له دوه کلنۍ څخه) د فلو يعني زکام کلني واکسين	نیوموکوکل انفلوینزا	د ناروغي یا درملنې له امله د خونديتوب کمېدل <sup>2</sup>
MenACWY MenB PCV13 (تر لس کلنې پورې) 3 PPV (له دوه کلنۍ څخه) د فلو يعني زکام کلني واکسين	د مینګوکوکل ګروپونه A، B، C، W او Y مینګوکوکل انفلوینزا	کمپلیمنټ يعني د وينې د مدافعت بې قاعدگياني (د هغو کسانو په شمول چې د کمپلیمنټ د مخنیوی درملنه ترلاسه کوي)

[1] په هر عمر کې چې په شدید مدافعتی فشار کې وي [2] د کورنۍ د هغو غړو او هغو کسانو لپاره چې د دې شرایطو سره د خلکو پاملرنه کوي د انفلوینزا کلني واکسين په پام کې ونیسئ [3] که له دوو کالو څخه تر لسو کلونو کم عمر لرونکي وي او د مینګوکوکل انفیکشن په وړاندې واکسين شوي نه وي یا په جزوي ډول واکسين شوي د PCV13 یو ډوز.

## د ماشومتوب د واکسين کولو غوره کر شوې برنامہ

تارکټ گروپ	عمر او مهالوېش	ناروغي	لازم واکسين
هغه ماشومان چې په هيباتيس بى اخته ميندو زيږولي وي	د زيږدلو پر مهال، څلور اونۍ او 12 مياشتې عمر لري <sup>1,2</sup>	هيباتيس بى	Hepatitis B (Engerix B/HBvaxPRO)
د هيواد هغه سيمې چې ماشومان پکښې د نري رنځ پېښې لري <sup>4</sup> 40/100,000	تر زېږدلو شاوخوا 28 ورځې وروسته <sup>4</sup>	نري رنځ	BCG
هغه ماشومان چې مور او پلار يا نيکه يې په يوه داسې هيواد کې زيږيدلي وي چې پېښې پکښې رامنځ ته سوې وي <sup>3</sup>	تر زېږدلو شاوخوا 28 ورځې وروسته <sup>4</sup>	نري رنځ	BCG
اوميدواري ښځې	د اومېندواري په هره مرحله کې د فلو يعنې زکام په موسم کې د اميندواري د 16 اونيو څخه <sup>5</sup>	انفلوینزا يعنې زوکام پرتوسس	نافعال کرل سوي فلو واکسين dTaP/IPV (Boostrix-IPV)

[1] د HBsAg لپاره په 12 مياشتو کې وينه واخلى چې د انفېکشن مخه ونیول سي [2] سربيره پردې 6-in-1 واکسين په 8، 12 او 16 اونيو کې ورکول کېږي [3] چېرې چې د نري رنځ کلنۍ پېښې،  $\geq 40/100,000$  دی - وگورئ - gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country [4] rates-per-100000-people د BCG ورکولو مخکښې د SCID د سکرينينگ پايله وگورئ [5] دا معمولاً له انومالي سکن وروسته ورکول کېږي



Produced by  
**UK Health Security Agency**

© Crown copyright 2022

Pashto 2022QG1PAS 1p 500K JUN 2022

UK Health Security Agency gateway number: 2022590

.This edition first published December 2019

که تاسو د دغه لېفلټ نورو کاپي ته اړتيا لرئ، نو لطفأ دلته يې وگورئ

www.healthpublications.gov.uk چې د

له هيلټ پبليکېشنز آرډر لاین سره اړيکه ونیسئ. Ph1: 0300 123 1002

Minicom: 0300 123 1003 (د سهار له 8 بجو څخه تر 6 بجو، دوشنبه تر جمعې پورې)

لطفأ د محصول کوډ وکاروئ: Pashto 2022QG1PAS

[www.nhs.uk/vaccinations](http://www.nhs.uk/vaccinations)