



UK Health
Security
Agency

NHS

حامله ياست؟

واکسين کول تاسو او ستاسو
ماشوم د ساري ناروغيو په
ساتنه کې مرسته کوي

واکسين کول:

Flu

زکام (انفلونزا)

Whooping cough

وچ توخی

(پرتوسس)

German measles

جرمني شري

(روبيلا)



immunisation

دا پانه هغه واکسینونه تشریح کوي چې د امیندواری پر مهال او وروسته ستاسو او ستاسو ماشوم په ساتنه کې مرسته کوي.

واکسین څنگه کار کوي؟

واکسین ستاسو د بدن طبیعي دفاعي سیستم (د معافیت سیستم) سره مرسته کوي ترڅو محافظتي انټي باډي رامینځته کړي. انټي باډي د ناروغۍ سره مبارزه کوي او اوږدمهاله محافظت رامینځته کوي.

نو، که تاسې د یوې ځانګړې ناروغۍ په وړاندې واکسین شوي یاست او تاسې له وروسته په دغه ناروغۍ اخته شئ، ستاسو دفاعي سیستم به په چټکۍ سره وایروس ته ځواب ووايي.

واکسین کولی شي د ناروغۍ مخنیوي کې مرسته وکړي یا ناروغي لږ جدي کړي. هغه اټي باډي چې د امیندواری په وخت تولید شي ستاسو زیږیدلي ماشوم ته هم انتقالیږي او د ژوند په لومړیو څو میاشتو کې د دوی په ساتنه کې مرسته کوي.



د زکام واکسین پدې معنی دي چې تاسو په زکام ناروغۍ د کم خطر سره مخ یاست، او ستاسو د جدي اختلالاتو خطر کموي لکه سینه بغل. د دغه دلایلو پر بنسټ، ټولو امیندوارو میرمنو ته سپارښتنه کېږي چې د زکام واکسین وکړي.

زما د ماشوم لپاره د زکام خطر څه دی؟

انفلونزا د نا زیږیدلي او نوي زیږیدلي ماشومانو لپاره جدي خطر کیدی شي او د وخت څخه دمخه زیږون، د کم وزنه ماشوم، مریږون یا حتی د ژوند په لومړیو اونیو کې د مریږنې لامل کیدی شي.

په واکسین کې څه شی شامل دي؟

د زکام واکسین په لاس کې یوه پیچکارې کول دی. دا معمولا د سپتمبر په پای کې موجود وي او د امیندواره میرمنو لپاره وړیا دی. دا د امیندواری په هر وخت کې خوندي دی او د واکسین کولو وروسته محافظت پیدا کولو لپاره شاوخوا 14 ورځې وخت نیسي.



د امیندواری پرمهال واکسین کول

Influenza (Flu) انفلونزا (زکام)

زکام څه شی دی؟

زکام یوه ډیره ساري ناروغي ده چې تبه، زکام، ځان درد او د مفصلونو او عضلاتو درد، سر درد او ډیره ستړیا یې ښکاره نښې دي. انفلونزا معمولا د زیات یخ وهل شوې حالت څخه بدتر دی او تاسو اړتیا لرئ چې څو ورځې په بستر کې تیر کړئ. که څه هم د ناروغۍ شدت په صحتمنده لویانو کې ډیر کم دي، خو ځینې وخت په روغتون کې بستر کیدو، دایمي معیوبیت او حتی مرگ لامل کیدی هم شي.


ولې په امیندواری کې انفلونزا یا زکام ډیر جدي دی؟

دا په امیندواری کې د عادي بدلونونو له کبله دي. ستاسو دفاعی سیستم په طبیعي توګه کمزوری کیږي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې ستاسو امیندواری بریالی شئ، مګر تاسو ممکن د وایرسونه په مقابل کې د مبارزې ډیر کم توان ولرئ. لکه څنګه چې ستاسو ماشوم وده کوي، تاسو ژور تنفس نشئ اخستی، د وایرسونو خطر لکه نمونیا یا سینه بغل زیاتېږي. په ګډه، دا بدلونونه کولی شي د امیندواره میرمنو لپاره خطر زیات کړي، په ځانګړې توګه د امیندواری په وروستیو کې او که چیرې د خطر نور عوامل شتون ولري لکه شکر.

یوه حامله میرمن چې په انفلونزا اخته کیږي د هغې میرمنې په پرتله چې حامله نه وي ممکن روغتون ته د داخلیدو اړتیا ډیره وي.



زه باید څه وکړم که فکر کوم چې زکام نیولی يم؟
په عاجل ډول خپل ډاکټر سره اړیکه ونیسئ او یادونه وکړئ
چې تاسو امیندواره یاست. دلته یو درمل شته چې تاسو یې
کولی شئ تاسو سره د ځینو نښو کمولو کې مرسته وکړي، مگر
تاسو یې باید ژر تر ژره د نښو راښکاره کیدو وروسته وخورئ
ترڅو کار وکړي. د زکام په وړاندې د خپل ځان او خپل ماشوم
د ساتنې غوره لاره دا ده چې د زکام د موسم له پیل څخه
مخکې واکسین وکړئ، معمولا د سپتمبر په شاوخوا کې، مگر
تاسو کولی شئ د ژمي په موسم کې هر وخت واکسین وکړئ.

زکام یا انفلونزا د امیندواره میرمنو او د دوی
ماشومانو لپاره جدي اختلالات رامنځته کولی شي. 
امیندواره میرمنې باید د هرې امیندوارۍ په جریان
کې د زکام وړیا واکسین وکړي. دا د امیندوارۍ په هر پړاو
کې کې ورکول کیدای شي او د زکام په موسم کې هر څومره
ژر چې وشي بهتره ده.

تور ټوخی (Pertussis)

تور ټوخی څه شی دی؟
د تور ټوخی یوه ډیره ساري ناروغي ده چې د یو کال څخه کم
عمر ماشومانو لپاره ډیره خطرناکه کیدی شي. ډیری کوچني
ماشومان چې د تور ټوخی ولري په روغتون کې بستر کېږي.
تور ټوخی کولی شي د اوږده ټوخی او د ساه بندۍ لامل شي
چې په ساه ایستلو کې ستونزه پیدا کوي. له هر ځل ټوخی
وروسته د "هوپ" آواز د ساه ایستلو کوبښ لپاره رامنځته
کېږي. د کوچنیو ماشومان سینه تل داسې غږ نه کوي نو ځکه
یې پیژندل ستونزمن وي.

د زکام واکسين جانبې عوارض د ناروغۍ په پرتله ډيرې لږې دي او په ټولو خلکو کې ليدل کېږي، نه يوازې په اميندواره ميرمنو کې. د انجیکشن په ساحه کې درد او سوروالي خورا عام دی. تاسو ممکن د سر درد، د عضلاتو درد، تبه يا ستريا هم ولرئ؛ دا معمولا د واکسين کولو وروسته يوه يا دوه ورځې دوام کوي هغه وخت چې واکسين په فعاليت پيل کوي. کله چې تاسو د زکام په موسم کې اميندواره ياست د زکام واکسين ته اړتيا لرئ.

زما د ماشوم لپاره څه گټې لري؟

د واکسين کولو په واسطه، تاسو د اميندوارۍ په جريان کې د زکام چانس کموي او په دې توگه د زکام څخه د اختلاطونو خطر کمېږي. ستاسو ماشوم به د زکام په وړاندې يو څه معافيت هم رامینځته کړي ځکه چې انټي باډي ستاسو څخه ستاسو ماشوم ته د نوم له لارې لېږدول کېږي. دا به هغوې ته د ژوند په لومړيو څو مياشتو کې يو څه خونديتوب چمتو کړي. لکه څنگه چې به تاسو د زکام فصل په اوږدو کې خوندي ياست، ډيرې لږ احتمال شته چې تاسو زکام ونيسی او خپل نوي ماشوم ته يې انتقال کړئ.

ايا د اميندوارۍ پرمهال د زکام واکسين کول خوندي دي؟

اميندواره ميرمنو ته وړانديز شوي د زکام واکسين يوازې وژل شوي (غير فعال) د زکام ويروسونه لري او نشي کولی د زکام لامل شي. د 2009 راهيسې، يو شمير هيوادونو په منظمه توگه ټولو اميندوارو ميرمنو ته د زکام واکسين وړانديز کړی. تحقيقات بښې چې غير فعال شوي د زکام واکسين د اميندوارۍ په ټولو مرحلو کې د مور او ماشوم دواړو لپاره په خوندي او مؤثره توگه مديریت کیدی شي.

ماشوم بیا د زیرون پرمهال د ټوخي په وړاندې یو څه محافظت لري. دا محافظت وروسته له ختمیږې او ستاسو ماشوم باید د 8 اونيو په عمر کې د ټوخي واکسين وکړي.

زه باید کله واکسين وکړم؟

ستاسو د ماشوم د ساتنې لپاره د واکسين کولو ترټولو غوره وخت ستاسو د امیندواری 16مه اونۍ یا ستاسو د امیندواری د مینځنۍ سکن څخه وروسته ده چې معمولا د 18 او 20 اونيو ترمنځ وي. که تاسو وړاندیز شوی وخت له لاسه ورکړئ تاسو کولی شئ د امیندواری په هر وخت کې واکسين وکړئ مگر تر ټولو ښه وخت د 16 او 32 اونيو ترمنځ دی. تاسو کولی شئ د امیندواری په وروستيو کې هم واکسين وکړئ مگر ممکن دومره اغيزمن نه وي. واکسين ستاسو په لاس کې یو ځل پیچکاري ده.

ځکه چې د ټوخي واکسين د وخت په تیریدو سره له مینځه ځي، تاسو باید واکسين وکړئ حتی که تاسو دا په ځوانۍ کې کړي هم وې یا که تاسو د ټوخي ناروغۍ لرلی وې. تاسو باید دا واکسين تکراري هم وکړئ، که تاسو دا په تیرو امیندواری کې کړي هم وې، ځکه چې په هر امیندواری کې واکسين ته اړتیا لیدل کیږي.

د ټوخي واکسين د زکام واکسين سره یو ځای هم ورکول کیږي مگر د ژمي موسم پورې انتظار مه کوئ ترڅو یې یوځای ترسره کړئ. ستاسو ماشوم به غوره خونديتوب ترلاسه کړي که تاسو د امیندواری له 16 اونۍ څخه واکسين ولرئ.

که تاسو د خپل GP جراح یا قابلې څخه پدې اړه خبر نه تر لاسه کړې، نو په لومړي فرصت کې د واکسين کولو لپاره وخت ونیسئ.

تور ټوخی معمولا د 2 څخه تر 3 میاشتو پورې دوام کوي. د ځوانو ماشومانو لپاره دا ممکن د سینه بغل او د دماغ د دايمي زیان لامل شي. په سخت حالت کې، دا ممکن د مړینې لامل شي.

هر کال شاوخوا 300 ماشومان د تور ټوخي سره روغتون ته وړل کېږي. د زکام نورې پیچلتیاوې عبارت دي له:

- د سختو تنفسې ستونزو په پایله کې په تنفس کې لنډمهاله وقفه
- د ډیر کانګې له امله د وزن کمیدل
- سیزر یا دماغې زیان
- انسفلایټس (د مغزو پرسوب)

زه ولې د ټوخي واکسین ته اړتیا لرم؟

په ۲۰۱۲ کال کې په برتانيا کې د تور ټوخي د اخته کسانو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، چې ۴۰۰ یې له دريو میاشتو کم عمره ماشومان وو او له دې ډلې ۱۴ یې مړه شوي دي.

د زیاتو مړینو د مخنیوي لپاره، د امیندوارو میرمنو لپاره د ټوخي واکسین پروگرام په 2012 کې پیل شو. تاسو ته به ستاسو د GP یا زیږون خدماتو لخوا د امیندواری له 16^{مې} اونۍ څخه د ټوخي واکسین وړاندیز کېږي. ستاسو بدن به د تور ټوخي لپاره انټي باډي تولید کړي کوم چې ستاسو ماشوم ته د نوم له لارې انتقالیږي. ستاسو



ایا د ټوخی واکسین د امیندواری پر مهال خوندي دی؟
مطالعاتو ښودلې چې د ټوخي واکسین ستاسو او ستاسو ماشوم
لپاره خورا خوندي دی. تاسو ممکن ځینې عام عادي جانبي
عوارض ولرئ. پدې کې دا شیان شامل دي: د پیچکاری ساحه
کې پرسوب، سوروالی او نرموالی.

لکه څنگه چې د تنها د ټوخي واکسین شتون نلري، په بازار کې
واکسین د تیتانوس، پولیو او ډیفټیریا په وړاندې هم محافظت
پیدا کوي. د واکسین دا ټولې برخې وژل شوي (غیر فعال
شوي) او په امیندواری کې په خوندي ډول ورکول کیدی شي.

دا ستاسو او ستاسو د ماشوم لپاره د واکسین لپاره خورا
خوندي دی د هغه په پرتله چې ستاسو نوي زیږیدلي ماشوم د
ټوخی له خطر سره مخ شي.

تور ټوخی د ځوانو



ماشومانو لپاره خورا

جدي ناروغي کیدی شي.

تاسو کولی شئ د امیندواری له 16مې

اونۍ وروسته ژر تر ژره د ټوخي واکسین وکړئ

او د خپل نوي زیږیدلي ماشوم په ساتنه کې

مرسته وکړئ.

په یاد ولرئ، حتی که تاسو د

امیندواری په وخت کې د ټوخي

واکسین اخیستی هم وي، هغه

محافظت له منځې ځي نو دا ډیره

اړینه او مهمه ده چې ستاسو ماشوم

په 8، 12 او 16 اونيو کې خپل

واکسین ترسره کړي.



ما فکر کاوه چې ماشومانو ته د ټوخي واکسين ورکول کيږي؟ په انگلستان کې، ماشومانو ته د 8، 12 او 16 اونيو په عمر کې د ټوخي واکسين ورکول کيږي. دوی ته د ټوخي واکسين تر 8 اونيو دمخه نه ورکول کيږي ځکه چې دوی ممکن سم فعاليت ونه کړي. ماشومان د بشپړ خونديتوب د توليدولو لپاره د واکسين 3 دوزونو ته اړتيا لري.

تاسو کولی شئ د امیندواری له 16مې اونۍ وروسته ژر تر ژره د ټوخي واکسين وکړئ او د خپل نوي زيږيدلي ماشوم په ساتنه کې مرسته وکړئ.



زما د ماشوم لپاره څه کټه لري؟

ستاسو د ماشوم د ژوند په لومړيو 2 مياشتو کې د ټوخي څخه د ژغورلو يوازینی لار دا ده چې پخپله د ټوخي واکسين وکړئ. هغه محافظت چې تاسو به يې د واکسين څخه ترلاسه کوئ ستاسو ماشوم ته د نوم له لارې انتقالیږي او ستاسو ماشوم د ټوخي څخه ساتي تر هغه چې کافي عمر ته ورسېږي ترڅو خپل واکسن وکړي.

څيړنو ښودلې چې واکسين په نويو زيږيدلو ماشومانو کې د ټوخي په مخنيوي کې خورا اغيزناک دی.

هغه محافظت چې تاسو يې د واکسين څخه ترلاسه کوئ پدې معنی دي چې احتمال شته چې تاسو ټوخی ونيسې او خپل ماشوم ته يې انتقال کړئ.

زه ولې د امیندواری وروسته د MMR واکسین ته اړتیا لرم؟
دا به تاسو او ستاسو ماشوم په راتلونکي امیندواری کې ساتي
او تاسو ته به د شری، ممپس او روبیلا په وړاندې اوږدمهاله
خوندیتوب درکړي. که تاسو مخکې دا واکسین نه وې اخستي
نو تاسو به د واکسین دوه دوزونو ته اړتیا. ستاسو نرس به
لومړی واکسین د زیرون د چیک اپ نه وروسته درکړي او
دوهم دوز به یوه میاشت وروسته درکړي. تاسو باید د واکسین
کولو وروسته د یوې میاشتې لپاره د امیندواری څخه مخنیوی
وکړئ، نو تاسو اړتیا لرئ چې د امیندواری یوه خوندي طریقه
ولرئ.

که تاسو ډاډه نه یاست چې تاسو د MMR واکسین کړی یا
نه، تاسو کولی شئ د خپل جراح ډاکټر سره د زیرون وروسته
معاینه وکړئ.

ایا زه کولی شم د واکسین کولو وروسته خپل ماشوم ته شیدې
ورکړم؟

هو، له هغې وروسته چې تاسو د MMR، فلو او د ټوخي
ټوخي واکسینونه لرئ، دا خوندي ده چې خپل ماشوم ته شیدې
ورکړئ. په حقیقت کې، که تاسو د امیندواری په وخت کې
د ټوخي واکسین ولرئ، ستاسو شیدې به محافظتي انټي باډي
ولري نو تاسو کولی شئ د خپل ماشوم دفاعي سیستم د مور په
شیدو سره لا ډیر قوي کړئ.

په امیندواری کې ټوخی

زه باید څه وکړم که چیرې ناروغ سره نيزدې پاتې شم، یا که
زه زما بدن خارېش پیدا کړي؟

تاسو باید خپلې قابله، GP یا د زیرون ډاکټر ته خبر ورکړئ
که چیرې تاسو په بدن د خارېش ناروغي لرئ یا د امیندواری
په جریان کې له داسې چا سره مخ شئ چې د بدن د خارېش
ناروغي لري.

د امیندواری دمخه یا وروسته واکسین کول

که تاسو د امیندواری پلان لرئ نو تاسو باید ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسو د ټولو واکسینونو سره تازه یاست.

روبیلا (د جرمني شری) یا Rubella (German measles)

د امیندواری په جریان کې په روبیلا اخته کیدل ستاسو د ماشوم لپاره خورا جدي کیدی شي، کوم چې د زیږیدونکي روبیلا سندروم یا congenital rubella syndrome (CRS) په نوم حالت رامینځته کوي. CRS کولی شي د کونډوالی، ږوندوالی، موتیانا (د سترگو ستونزې) یا حتی د زړه ستونزې رامینځته کړي. دا د ماشوم د مړینې یا د پای ته رسیدو احتمال هم زیاتوي.

تاسو به د روبیلا څخه خوندي اوسئ که چیرې تاسو مخکې په دغه ناروغۍ اخته شوې یاست یا که تاسو کوم وخت د روبیلا لرونکي واکسین دوه دوزونه اخیستي وي (د مثال په توګه روبیلا، د شری-روبیلا یا شری-ممپس-روبیلا په ښوونځي کې ورکول کيږي، په ماشومتوب کې، یا د جراحی وخت کې). که تاسو ډاډه نه یاست چې آیا تاسو د روبیلا انفیکشن یا واکسین لرئ، تاسو کولی شئ د خپل ډاکټر سره وګورئ.

په عامه توګه تاسو باید د امیندواری دمخه د روبیلا دوه دوزونه ترسره کړي وې. که تاسو واکسن نه وې کړي، نو د شري، ممپس او روبیلا واکسین (MMR) د امیندواری څخه 1 میاشت مخکې ورکول کیدای شي. MMR یو ژوندي (کمزوری) واکسین دی نو د امیندواری پرمهال نه ورکول کيږي. که څه هم داسې شواهد نشته چې د امیندواری په جریان کې د MMR واکسین ماشومانو ته زیان رسوي، خو بیا هم سپارښتنه کيږي چې تاسو د ماشوم تر زیږون پورې انتظار وکړئ.

نور واکسینونه چې د قابلې سره باید بحث پرې وکړئ

تور زیری یا هیپاتایتس B یا Hepatitis B

د زیرون په وخت کې، هغه میندې چې تور زیرې لري خپل زیریدلي ماشومان ته باید ژر تر ژره د تور زیرې واکسین وکړئ. ستاسو ډاکټر باید ستاسو د ماشوم لپاره د واکسین د نورو دوزونه ترتیبات برابر کړي او کله چې ماشوم 1 کلن وي شې نو د تور زیرې د معلومولو لپاره باید د وینې معاینه وشي.

BCG

هغه ماشومان چې مور او پلار (یا دا چې نیا او نیکه) یې د یو داسې هیواد څخه تابع پاتې شوي وې چېرته چې TB ډیر عام وي، باید د TB څخه د ساتنې لپاره د BCG واکسین وکړي.

د امیندواری پرمهال (او ستاسو د ماشوم له زیرون وروسته) دغه وړاندیز شوي واکسینونه یو له خورا اغیزمنو کړنو څخه دی چې پوسيله یې کولی شئ د خپل ځان او ماشوم لپاره د واکسین له لارې د اخته کیدو خطر راکم کړئ. ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسو ماشوم په 8مه، 12مه او 16مه اونيو کې واکسین کړئ دا پدې معنی چې دا محافظت به د دوی ترټولو زیان منونکي کلونو کې گټور ثابت شي.

د نورو معلوماتو لپاره لینکونه

www.nhs.uk/Conditions/vaccinations/Pages/vaccination-schedule-age-checklist.aspx

www.gov.uk/government/collections/immunisation

www.gov.uk/government/collections/immunisation-against-infectious-disease-the-green-book

www.medicines.org.uk/emc/

مهرباني وکړئ د زيږون کلينیک، د زيږون روغتون يا نورو اميندوارو ميرمنو ته مه نيزدې کيږئ تر هغه چې ستاسو ارزونه نه وي شوې.

هره ناروغي چې تاسو ته تبه او خارش پيدا کوي ممکن يوه ساري ناروغۍ وي چې ستاسو نا زيږيدلی ماشوم ته زيان رسولی شي. ممکن ستاسو ټيستونه ترسره شي ترڅو معلومه شي چې تاسو په ناروغۍ اخته شوي ياست کنه. د روغتيا متخصص چې ستاسو ارزونه کوي بايد په لاندې شيانو پوه شي:

- تاسو د څو اونيو اميندواره ياست
- کله له هغه کس سره مخ شوې چې خرابې پرې لږيدلي وو
- په کومه نيټه مو علايم وليدل يا هغه نيټه چې ناوړغ کس سره مخ شوئ
- د خرابې توضيحات (ايا دانه کئ دي، گرمکۍ دی يا دا له مايعاتو ډکې دانې دي؟)
- تاسو په تيرو وختونو کې کوم انتانونه درلودل لکه د چرگ پوکس، شری
- تاسو مخکې کوم واکسينونه کړي دي

که تاسو د يو چا سره په تماس کې ياست چې د خرابې پرې لگيدلې وي يا که تاسو د اميندواری په وخت کې له خرابې سره مخ شئ، ژر تر ژره د خپل ډاکټر يا قابلې څخه مشوره واخلي.

که تاسو د خرابې ناروغۍ په راپور ورکولو کې ځنډ وکړئ نو شايد ستاسو دقيق تشخيص ونشي يا مو سمه درملنه ونشي.

د امیندواری واکسین ریکارډ

لاندې خپل د امیندواری واکسین ثبت کړئ ترڅو ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسو او ستاسو ماشوم د زکام، ټوخي ټوخي او روبیلا (جرمن شري) په وړاندې د خونديتوب له لاسه مه ورکوئ.

واکسین	کله باید واکسن وکړئ	نېټه وټاکل شوه
زکام	د امیندواری په هر پړاو کې د زکام په موسم کې	
تور ټوخي	د امیندواری له 16 مې اونۍ څخه، ستاسو له سکن وروسته	
د MMR دوز 1*	د ماشوم د زیږون وروسته، د زیږون 6 اونۍ وروسته معاینه وکړئ (د ډاکټر یا نرسې سره).	
د MMR دوز 2*	د لومړي دوز څخه څلور اونۍ وروسته (لکه پورته).	

* که مخکې مو واکسین نه وي کړي



© Crown copyright 2022

2903655PAS Pashto 1p 850K NOV 2021

UK Health Security Agency gateway number: 2022095

لومړی په مارچ 2016 کې خپور شو

د دې سند متن ممکن د رسمي اجازې یا لګښت پرته بیا تولید شي د شخصي یا کور دننه کارونې لپاره چاپ شي.

د دې معلوماتي پاڼې د نورو کاپیونو د اردر لپاره له لاندې ویب سایټ لیدنه وکړئ: www.healthpublications.gov.uk

یا زنگ ووهئ: 0300 123 1003، Minicom: 0300 123 1002 (د سهار له 8 بجو څخه تر 6 بجو، دوشنبه تر جمعي)