




UK Health
Security
Agency

Td/IPV له 3 څخه د 1 کس لپاره کمکي واکسين



په خپله 14 کلنۍ کې، او يا د ښوونځي په 9م کال کې کولی شئ د ځوانانو تقویتی واکسين ته په شرایطو برابر شئ چې دا واکسين کولی شي له تیتانوس، دفتريا او پوليو څخه مخنیوی وکړي. د Td/IPV واکسين به د دې ناروغیو پر وړاندې ستاسو د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کړي چې د وخت په تېرېدو سره یې شدت راکمېږي.

د NHS د واکسينو تطبیق د ځوانانو لپاره واکسين



د ځوانانو د واکسينو په هکله د نورو معلوماتو لپاره
www.nhs.uk/vaccinations وېبسایت ته مراجعه وکړئ او يا
<https://qrco.de/YoungPeopleImms> ولولئ



کولی شئ هغه دوزونه په آسانۍ سره بېرته اعاده کړئ چې له لاسه مو ورکړي دي.

دا لارښود د بریتانیا د امنیتي ادارې له خوا ترتیب شوی او تولید شوی دی.
© Crown copyright 2023. 1P 100K JULY 2023 (APS). Product code: YP3BG1PAS
Pashto. UK Health Security Agency gateway number: 2023178.

دا لارښود کولی شئ له لاندې لینک څخه ترلاسه کړئ
www.healthpublications.gov.uk او یا لادي شمېرې ته ټنګ ووهئ 0300 123 1002
(دا کرښې له دوشنبه تر جمعي د سهار له 8 څخه د مازدګیر تر 6 پورې د لاسرسي وړ دي).

د دې لارښود انګلیسي نسخې د درخواست په صورت کې د لاسرسي وړ دي.
د غوښتنې په وخت کې د دې لارښود ترجمه شوې نسخې هم د لاسرسي وړ دي.

آیا جاني عوارض لري؟

د پیچکاری په ځای کې پړسوب، سوروالی، او خارش پيدا کېدل ډېر معمول دي. ځینې اوقات وړې بې درده دانې هم پیدا کېږي، لیکن معمولا په څو اوښو کې بېرته له منځه ځي. نور شدید تاثیرات هم لري لکه تبه، سردرد، گنگسوالی یا د کمزورۍ احساس، او د ناروغتیا احساس او پړسېدلې غدې.

که چېرې د واکسينو له تطبیق وروسته د ناروغتیا احساس کوئ، پړستامول وخورئ. د بوتل یا پاکټ پر سر لیکل شوي لارښوونې په دقت سره ولولئ او نظر خپل سن ته مو د درمول مناسب دوز مصرف کړئ. که چېرې اړینه وي نو له 4 تر 6 ساعتونو وروسته دوهم دوز مصرف کړئ.

که چېرې د دوهم دوز له تطبیق وروسته مو بیا هم د بدن د حرارت درجه لوړه وه، نو له GP سره خبرې وکړئ او یا د NHS د 111 مرستندويې شمېرې سره اړیکه ونیسئ.

که چېرې د واکسينو له تطبیق وروسته مو جاني عوارض لرل، کولی شئ په هکله یې د Yellow Card وېبسایت له لارې او یا د 0800 731 6789 شمېرې له طریقه موږ ته خبر راکړئ (له دوشنبه تر جمعي د سهار له 9 بجو څخه د مازدګیر تر 5 پورې) او یا هم د Yellow Card اپلیکېشن ډوللو کړئ. www.mhra.gov.uk/yellowcard

اوس ښه وخت دی ترڅو وګورئ چې آیا تر ټولو تازه واکسين مو ترلاسه کړي دي او که نه

دا واکسين ما له کومو ناروغيو څخه ژغوري؟

تيتانوس

T

تيتانوس يوه درد لرونکي ناروغي ده چې په عصبي سيستم باندې اغېزه کوي او ممکن د عضلاتو د کشش، تنفسي ستونزو، او حتی د مرګ سبب شي. دا ناروغي د بدن د زخمونو يا شکېدليو ځايونو له لارې بدن ته د خاورې د کوچني ذراتو او ژونديو توکو له داخلېدو څخه رامنځته کېږي. تيتانوس له يو شخص څخه بل شخص ته نه منتقلېږي.

دفتريا

D

دفتريا يو ډول جدي ناروغي ده چې معمولا د ستوني په درد باندې پيلېږي او په ګړنديتوب سره تنفسي ستونزې رامنځته کوي. دا ناروغي زړه او عصبي سيستم تخریبوي، او که شديده شي حتی د مړينې سبب ګرځي.

پوليو

IPV

پوليو داسې وېروس دی چې په عصبي سيستم باندې حمله کوي چې ممکن د عضلاتو د دايمي فلج سبب شي. که چېرې د سينې په عضلاو يا مغز باندې اغېزه وکړي، نو پوليو د مرګ سبب هم کېدای شي.

د ځوانانو تقويې واکسينو ته Revaxis ويل کېږي، کولی شئ د ناروغانو په هکله يې د معلوماتو لارښود دلته وګورئ www.medicines.org.uk/emc/product/5581/pil

که چېرې زه په ماشومتوب کې د تيتانوس، دفتريا او پوليو واکسين ترلاسه کړم، آیا کولی شم پر وړاندې يې بشپړ محافظت ترلاسه کړم؟

نه، تاسو به د دې لپاره يوه تقويې واکسين ته ضرورت ولرئ ترڅو وکولی بشپړ محافظت ترلاسه کړئ.

څو دانې تقويې واکسينونه بايد ترلاسه کړم؟

تاسو د تيتانوس، دفتريا او پوليو واکسينو 5 دوزونو ته اړتيا لرئ ترڅو بشپړ معافيت ترلاسه کړئ.

تاسو بايد:



په ماشومتوب کې لومړي 3 دوزونه ترلاسه کړي وي



تاسو بايد د خپلې 3 او 5 کلنۍ ترمنځ د دې واکسينو 4م دوز ترلاسه کړي وي، دا له ښوونځي څخه مخکې تقويې واکسين دي



5م دوز بايد په 9م کال کې ترلاسه شي (د 13 او 14 کلنۍ ترمنځ)

آيا په راتلونکي کې نورو تقويې واکسينو ته هم اړتيا لرم؟

ممکن تاسو د دې واکسينو نورو تقويې دوزونو ته اړتيا و نه لرئ. ليکن، که چېرې مشخصو هېوادونو ته سفر کوئ او يا مو بدن زخمي وي، نو ممکن د واکسينو نورو دوزونو ته هم اړتيا ولرئ، او ممکن د تيتانوس واکسين بلې پېچکارۍ ته اړتيا پيدا شي. د خپل GP په مرکز کې له خپل نرس سره خبرې وکړئ.

زه به د Td/IPV تقويې واکسين څنگه پيل کوم؟

تاسو ته به په ځنگل کې يوه پېچکاري تزريق شي. پېچکاري د هېچا نه خوښېږي، ليکن دا به په ډېر سرعت سره تطبيق شي. په پېچکاريو کې استفادې کېدونکې ستنې وړې دي او يوازې کم درد به احساس کړئ. که چېرې د پېچکارۍ د تطبيق په هکله اندېښنه لرئ، نو مخکې له تطبيق څخه يې له نرس يا ډاکټر سره خبرې وکړئ.

آيا نور داسې واکسين هم شته چې بايد ترلاسه يې کړم؟

کله مو چې د Td/IPV تقويې واکسين ترلاسه کړ، نو تاسو د MenACWY واکسينو لپاره هم په شرايطو برابرېږئ. تاسو بايد دا واکسين مخکې د ښوونځي له بشپړولو څخه ترلاسه کړئ. که چېرې تر اوسه په ښوونځي کې ياست ليکن تر اوسه مو دا واکسين نه وي ترلاسه کړي، د ښوونځي له نرس سره خبرې وکړئ. که چېرې مو ښوونځی بشپړ کړی وي، نو بايد له خپل GP سره خبرې وکړئ ترڅو بهرته يې جبران کړئ. له GP سره ستاسو خبرې کول يو ښه کار دی ځکه چې کولی شئ وګورئ چې آیا تازه واکسين مو ترلاسه کړي دي او که نه، مثلاً HPV او MMR (سرځکان، شپږۍ، چيچک).



که چېرې مو تر اوسه هېڅ وخت د MMR واکسين نه وي ترلاسه کړي، نو بايد يو دوز يې اوس او بل دوز يې 1 مياشت وروسته ترلاسه کړئ ترڅو د سرځکانو، شپږي، او چيچک پر وړاندې خوندي پاتې شئ.